

微积分 A2 多元积分复习

Ben Hou

Tsinghua University

May 2021

目录

1 重积分

- 概念和性质
- 计算方法
- 问题

2 曲线积分

- 第一型曲线积分
- 第二型曲线积分
- Green 公式
- 问题

3 曲面积分

- 第一型曲面积分
- 第二型曲面积分
- Stokes 公式
- 问题

目录

1 重积分

- 概念和性质
- 计算方法
- 问题

2 曲线积分

- 第一型曲线积分
- 第二型曲线积分
- Green 公式
- 问题

3 曲面积分

- 第一型曲面积分
- 第二型曲面积分
- Stokes 公式
- 问题

可积性理论

基本概念

分划, 标志点组, Riemann 和, Darboux 上和和 Darboux 下和, etc.

定理

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界闭集, f 是 D 上的一个有界函数. 如果 f 在 D 内的间断点是零面积集, ∂D 也是零面积集, 那么 f 在 D 上 Riemann 可积.

性质

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界闭集而且 ∂D 是零面积集, $f, g \in R(D)$, 则有:

- (线性) 对于任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\lambda f + \mu g \in R(D)$ 而且
$$\int_D (\lambda f + \mu g) dV = \lambda \int_D f dV + \mu \int_D g dV.$$
- (保序性) 若 $f \leq g$ (处处成立), 则 $\int_D f dV \leq \int_D g dV$.

重积分性质

性质

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界闭集而且 ∂D 是零面积集, $f, g \in R(D)$, 则有:

- (可加性) 若 $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^n$ 满足上述要求且 $D_1 \cap D_2$ 是零面积集, $f \in R(D_1), R(D_2)$, 则 $f \in R(D_1 \cup D_2)$ 而且

$$\int_{D_1 \cup D_2} f dV = \int_{D_1} f dV + \int_{D_2} f dV.$$

- (绝对值不等式) 有结论 $|f| \in R(D)$ 而且

$$\left| \int_D f dV \right| \leq \int_D |f| dV.$$

- (积分中值定理) 设 D 还是一个连通集, f, g 进一步是 D 上的连续函数, g 在 D 上不变号, 则存在 $\xi \in D$ 使得

$$\int_D f g dV = f(\xi) \int_D g dV.$$

方法 I: 累次积分

命题 (以二重积分为例)

记 $D = [a, b] \times [c, d]$, 设 $f \in R(D)$, 如果对于任意 $x \in [a, b]$, 函数 $f(x, y)$ 都关于 y 在 $[c, d]$ 上可积, 则有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dx \int_a^b f(x, y) dy.$$

注

在含参积分中, 我们证明过: 如果 $f \in C(D)$, 则

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) d\sigma.$$

一般直接使用累次积分解决的问题都伴随着换序这一过程.

方法 II: 变量代换

定义

设 $G \subset \mathbf{R}^n$ 是一个开集, $T: G \rightarrow \mathbf{R}^n$ 是一个 C^1 -光滑单射而且 $\det DT(\mathbf{u}) \neq 0$ 对于任意 $\mathbf{u} \in G$ 成立, 则称 T 是一个正则变换.

命题

设 $G \subset \mathbf{R}^n$ 是一个开集, $T: G \rightarrow \mathbf{R}^n$ 是一个正则变换, $\Omega \subset G$ 是一个闭矩形, $f \in C(T(\Omega))$, 则有

$$\int_{T(\Omega)} f(\mathbf{x}) dV = \int_{\Omega} f(T(\mathbf{u})) |\det DT(\mathbf{u})| dV.$$

示警

累次积分换元建议先变成重积分, 换元之后再变成累次积分.

例子

坐标系变换

常用的一类变量代换是坐标系的变换: 2 维中的极坐标系, 3 维中的柱坐标系和球坐标系.

极坐标系:

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$dxdy = r dr d\theta$$

柱坐标系:

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$

$$dxdydz = r dr d\theta dz$$

球坐标系:

$$x = r \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = r \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = r \cos \varphi$$

$$dxdydz = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

方法 III: 对称性

同时关注积分区域和函数.

试举一例: 当积分区域 D 对称于 x 轴时, 如果函数 $f(x, y)$ 关于变量 y 是奇函数 (即 $f(x, -y) = -f(x, y)$), 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0.$$

如果是偶函数 (即 $f(x, -y) = f(x, y)$), 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D'} f(x, y) dx dy,$$

其中 D' 是 $D \cap \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 | x \geq 0\}$.

对称于 y 轴? 对称于原点?

问题 A

请计算下列积分.

$$\textcircled{1} I = \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx.$$

$$\textcircled{2} I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |3x+4y| dx dy.$$

$$\textcircled{3} I = \iint_D x \sin(y^3) dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 是由曲线 } y^2 = x \text{ 和 } x = 1 \text{ 围成的有界区域.}$$

$$\textcircled{4} I = \iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz, \text{ 其中 } \Omega \text{ 是曲面 } 2z = x^2 + y^2 \text{ 和曲面 } x^2 + y^2 + z^2 = 3 \text{ 所围成的区域.}$$

$$\textcircled{5} I = \iint_D x^5 y^{11} dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y) | 1 \leq x^{-1} y^2 \leq 2, 3 \leq x^3 y^2 \leq 4\}.$$

$$\textcircled{6} I = \iint_D x dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 是以 } (x_i, y_i), 1 \leq i \leq 3 \text{ 为顶点, 面积为 } A \text{ 的三角形.}$$

问题 B

- 请证明球的单层位势表达式, 其中 $a^2 + b^2 + c^2 > R^2$.

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} \frac{dxdydz}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} = \frac{4\pi R^3}{3\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

- 设 $f(x) \in R[a, b]$, 请证明:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.$$

- 设 $\Omega = (a, b) \times (c, d)$ 是一个开矩形, $f(x, y)$ 是 Ω 上的连续函数. 如果对于任一闭矩形 $B \subset \Omega$ 都有 $\int_B f(x, y)d\sigma = 0$, 请证明 $f(x, y) \equiv 0$.

目录

1 重积分

- 概念和性质
- 计算方法
- 问题

2 曲线积分

- 第一型曲线积分
- 第二型曲线积分
- Green 公式
- 问题

3 曲面积分

- 第一型曲面积分
- 第二型曲面积分
- Stokes 公式
- 问题

C^1 -正则曲线

定义

我们称 $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是一条 C^1 -正则曲线, 如果它满足以下两个条件:

- 参数表达式 $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 中 $x(t), y(t), z(t) \in C^1[a, b]$.
- $D\gamma(t) \neq 0$ 对于任意 $t \in (a, b)$ 成立.

进一步地, 如果区间 $[a, b]$ 存在一个有限分划

$\mathcal{P} = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b\}$, 使得 $\rho : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 限制在每个 $[t_i, t_{i+1}] (0 \leq i < n)$ 上是正则的 C^1 参数曲线, 则称 ρ 是一条逐段 C^1 -正则曲线.

以下出现的曲线都是逐段 C^1 -正则曲线.

注

曲线和下面要讨论的曲面的严格定义出现在微分几何一门课程中, 我们不能深入讨论. 曲线曲面积分的一般形式则涉及几何测度论一课, 需要使用的工具是 Hausdorff 测度.

第一型曲线积分

定义

设 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是一条 (逐段 C^1 -正则) 曲线, 函数 $f: \text{Im } \gamma \rightarrow \mathbf{R}$. 将 $[a, b]$ 作分划 $\mathcal{P} = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b\}$, 从而诱导 γ 上的分划 $\Delta\gamma_i (1 \leq i \leq n)$. 每段 $\Delta\gamma_i$ 的长记作 Δs_i . 任取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta\gamma_i$, 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i$. 若以下极限存在, 则称极限值为 f 在 γ 上的 (第一型) 曲线积分,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i =: \int_L f(x, y, z) ds.$$

注

考查参数形式 $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$. 如果 $f \in C^1(\text{Im } \gamma)$, 则有

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

第二型曲线积分

这节我们进一步假设曲线不发生自交. 粗略地说, 我们认为 $\gamma(t) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 中参数 t 增加的方向规定了曲线的正方向, 减少的方向给定负方向. 记 $A = \gamma(a), B = \gamma(b)$, 此时又记带方向的曲线 γ 为 \widehat{AB} .

定义

假设如上, 在 \widehat{AB} 上给定向量值函数 $\mathbf{F} : \widehat{AB} \rightarrow \mathbf{R}^3$. 同时考虑以上分划过程及记号, 并记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \Delta y_i = y_i - y_{i-1}, \Delta z_i = z_i - z_{i-1}$. 如果以下极限值存在, 则称极限是向量值函数 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (P(\mathbf{x}), Q(\mathbf{x}), R(\mathbf{x}))$ 在 \widehat{AB} 上的 (第二型) 曲线积分,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i &=: \int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy + R dz \\ &=: \int_{\widehat{AB}} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned}$$

计算方法

注

易见

$$\int_{\widehat{AB}} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} = - \int_{\widehat{BA}} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l}.$$

注

如果 \widehat{AB} 由 $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ 给出正方向而且向量值函数 $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C(\widehat{AB})$, 则有

$$\int_{\widehat{AB}} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \langle \mathbf{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt.$$

Green 公式

设 D 是一个平面有界闭区域, ∂D 是有限条互不相交的闭曲线的并, L 是 ∂D 的一条闭曲线.

沿 L 原有正方向前进, 如果区域 D 在左手侧, 则称该方向是 L 与 D 兼容的定向. 否则, 称原有正方向的反方向是 L 与 D 兼容的定向. 记 ∂D^+ 为所有 ∂D 上的闭曲线, 而且所有曲线的正方向都与 D 兼容.

定理 (Green 公式)

假设如上. 给定向量值函数 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) : D \rightarrow \mathbf{R}^2$ 满足 $P, Q \in C^1(D)$, 那么我们有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial D^+} P dx + Q dy = \int_{\partial D^+} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l}.$$

问题 A

- ① 请计算第一型曲线积分 $I = \int_L x^2 ds$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线.
- ② 请计算第二型曲线积分 $I = \int_{\widehat{AB}} y dx - x dy$. 其中 $A = (1, 1), B = (2, 4)$. 而 $\int_{\widehat{AB}}$ 分为以下两种情况:
 - $\int_{\widehat{AB}}$ 是连接 A, B 的直线.
 - $\int_{\widehat{AB}}$ 沿抛物线 $y = x^2$.
- ③ 请计算第二型曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$. 而 L 分为以下两种情况:
 - $L: x^2 + y^2 = a^2$ 沿逆时针方向.
 - L 是区域 $D: |x| \leq 1, |y| \leq 1$ 的边界, 方向与区域兼容.
 - 环绕原点一周的 C^1 -正则不自交闭曲线.
 - 环绕原点两周的 C^1 -光滑闭曲线 (除至多一点外正则).
- ④ 请计算第二型曲线积分 $I = \int_{\widehat{AO}} (e^x \sin y - y^2) dx + e^x \cos y dy$, 其中 \widehat{AO} 是从 $A = (a, 0)$ 到 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$.

问题 B(调和函数的刻画)

设 Ω 是一个平面单连通开区域, $u(x, y) \in C^2(\overline{\Omega})$. 我们称 u 是一个调和函数如果 u 满足偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

在此假设下开展以下问题.

- ① 请证明 u 是一个调和函数的一个等价描述是对于任意圆 $B \subset \Omega$, 都有

$$\int_{\partial B} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0.$$

- ② (Poisson 公式) 请证明 u 是一个调和函数的一个等价描述是对于任意 $P_0(x_0, y_0) \in \Omega$ 都有

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta,$$

其中 $0 < r < d(P_0, \partial\Omega)$.

第二型曲线积分与路径无关

命题

设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是一个单连通开区域, 向量值函数 $\mathbf{F}(x, y) : D \rightarrow \mathbf{R}^2$ 是 C^1 的. 以下命题等价:

- ① $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$.
- ② 任取 $A, B \in D$, 任取路径 L_1, L_2 从 A 至 B 都有 $\int_{L_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_{L_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$.
- ③ 沿任何闭环路 C 的环路积分等于 0.
- ④ 存在某个函数 $u(x, y)$ 使得 $du = F_1 dx + F_2 dy$.

注

性质 2,3 等价不需要单连通的条件, 但性质 1 涉及, 更多的知识需要进一步地讨论代数拓扑中的上同调理论, 它研究闭微分形式和恰当微分形式.

问题 C(线积分和积分路径)

① 请问下列第二型曲线积分在区域 Ω 上是否和路径相关?

- $I_1 = \int_{AB} \frac{xdx + ydy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$, 而 $\Omega : y > 0$.
- $I_2 = \int_{AB} \frac{xdx + ydy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$, 而 $\Omega : x^2 + y^2 > 0$.
- $I_3 = \int_{AB} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 而 $\Omega : x^2 + y^2 > 0$.

② 请证明在平面区域 $x^2 + y^2 > 0$ 上, 向量场

$$\mathbf{F} = \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{y}{x^2 + y^2} \mathbf{j}$$

是保守场.

目录

1 重积分

- 概念和性质
- 计算方法
- 问题

2 曲线积分

- 第一型曲线积分
- 第二型曲线积分
- Green 公式
- 问题

3 曲面积分

- 第一型曲面积分
- 第二型曲面积分
- Stokes 公式
- 问题

基本概念

定义 (逐片 C^1 光滑-正则曲面)

考查 C^1 光滑向量值函数 $\mathbf{r}: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 其形式为

$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. 如果向量

$\mathbf{r}'_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right)$, $\mathbf{r}'_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right)$ 之间线性无关, 则称 $S = \text{Im } \varphi$ 是 \mathbb{R}^3 中一张 C^1 光滑-正则曲面.

同理可以定义逐片 C^1 光滑-正则曲面.

以下讨论中, 默认所有曲面是由参数方程给出的逐片 C^1 光滑-正则曲面, 并保持如上记号体系.

定义 (曲面面积)

记 $E = \langle \mathbf{r}'_u, \mathbf{r}'_u \rangle$, $G = \langle \mathbf{r}'_v, \mathbf{r}'_v \rangle$, $F = \langle \mathbf{r}'_u, \mathbf{r}'_v \rangle$. 则曲面 S 的面积是

$$\text{Area}(S) = \iint_D \sqrt{EG - F^2} dudv.$$

第一型曲面积分

定义 (第一型曲面积分)

设 S 是 (逐片 C^1 光滑-正则) 曲面, $f: S \rightarrow \mathbf{R}$. 作 S 的分划 $\mathcal{P} := \{\Delta S_i | 1 \leq i \leq n\}$, 每一小片面积记为 ΔS_i . 在每个小片上任取 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$, 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} d(\Delta S_i)$. 如果下面极限值存在, 则称它是 f 在 S 上的 (第一型) 曲面积分,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta S_i =: \iint_S f(x, y, z) dS.$$

注

若 S 是由参数形式 $\mathbf{r}(u, v) : D \rightarrow \mathbf{R}^3$ 给出的, $f(x, y, z) \in C(S)$, 则有

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

第二型曲面积分

这节总假设 S 是一张可定向曲面. 记 $\mathbf{n} = \mathbf{r}'_u \wedge \mathbf{r}'_v$ 为曲面 S 的外法向量. 记 $\mathbf{N} = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|}$ 是单位外法向量. S 的正方向取作 $\mathbf{r}'_u, \mathbf{r}'_v, \mathbf{n}$ 成右手系的方向, 否则称为负方向. 下列讨论保持以上假设.

定义

设向量值函数 $\mathbf{F} : S \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是 S 上连续函数, 定义

$$\iint_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{N} \rangle dS =: \iint_S F_1 dy \wedge dz + F_2 dz \wedge dx + F_3 dx \wedge dy$$

为向量值函数 \mathbf{F} 的 (第二型) 曲面积分.

注

易见, 若 S 取定正方向,

$$\iint_S F_1 dy \wedge dz + F_2 dz \wedge dx + F_3 dx \wedge dy = \iint_D \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle dudv.$$

Gauss 公式

设 $D \subset \mathbf{R}^3$ 是一个有界闭区域, ∂D 由有限个逐段光滑, 互不相交的闭曲面构成且整体可定向. 设向量值函数 $\mathbf{F} \in C^1(D)$, 它的散度定义为:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

定理 (Gauss 公式)

上述前提下有

$$\int_{\partial D^+} F_1 dy \wedge dz + F_2 dz \wedge dx + F_3 dx \wedge dy = \iiint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz.$$

其中 ∂D^+ 指外法线方向定义的曲面正向.

Stokes 公式

上述前提下, 向量值函数 $\mathbf{F} \in C^1(D)$ 的旋度定义为:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}.$$

定理 (Stokes 公式)

设有界曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个分块光滑可定向曲面, ∂S 由有限个逐段光滑, 互不相交的闭曲线构成. 设向量值函数 $\mathbf{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 C^1 的, 其中 Ω 是包含 S 的一个开集. 则有

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \iint_{S^+} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

注

微分形式下的 Stokes 公式包含 Green 公式和 Gauss 公式.

问题 A

- ① 请计算第一型曲面积分 $I = \iint_S (x + y + z) dS$, 其中
 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$.
- ② 请计算第二型曲面积分 $I = \iint_S \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 而
 S 分为以下两种情况:
- $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 沿正向.
 - $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$.
 - 环绕原点一周的 C^1 -正则不自交闭曲面.
- ③ 请计算第二型曲面积分 $I = \iint_S x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy$, 其中
 S 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2 (0 \leq z \leq h)$ 所示部分的外侧.
- ④ 计算第二型曲线积分 $\oint_C ydx + zdy + xdz$, 其中 C 是球面
 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 Ox 轴正向看去,
 C 是沿逆时针方向前行.

问题 B(Green 定理)

设 D 是一个单连通闭区域, $S = \partial D$ 是一条 C^1 -正则不自交闭曲面, 函数 $u(x, y, z), v(x, y, z) \in C^2(D)$. 请证明

$$\begin{aligned} \iint_S v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS &= \iiint_D v \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right] dx dy dz \\ &+ \iiint_D \left[\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right] dx dy dz. \end{aligned}$$

问题 C(调和函数的表现)

设 D 是一个单连通闭区域, $S = \partial D$ 是一条 C^1 -正则不自交闭曲面, 函数 $u(x, y, z) \in C^2(D)$, 我们称 u 是 D 上的调和函数如果 u 满足偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

设 $u, v \in C^2(D)$, u 是 D 上的调和函数, 在此条件下讨论问题.

- 1 进一步假设 $u|_S = 0$, 请证明 u 在 D 上恒为 0.
- 2 假设 $[w(x, y, z) - u(x, y, z)]|_S = 0$, 请证明

$$\begin{aligned} & \iiint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz \\ & \leq \iiint_D \left[\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz. \end{aligned}$$

问题 D(闭形式和恰当形式在 \mathbb{R}^3 上的表现)

设 $D = \overline{B(0,1)} \subset \mathbb{R}^3$, $P, Q, R \in C^1(D)$. 证明以下命题等价:

- ① 对于任意 $S_1, S_2 \subset D$ 是两定向光滑曲面, $\partial S_1 = \partial S_2$ 而且由 S_1, S_2 的定向决定的边界正定向相同, 则有

$$\iint_{S_1} Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy = \iint_{S_2} Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy.$$

- ② 任取 S 是 D 内光滑闭曲面都有

$$\iint_S Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy = 0.$$

③ $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0.$

- ④ 存在 η 使得 $d\eta = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy.$